

# Euthanasie rapide des poussins en mauvaise condition physique

Les éleveurs avicoles sont déterminés à produire des aliments de grande qualité, salubres et abordables tout en veillant au bien-être et à la santé de leurs troupeaux.

Malgré les bonnes pratiques de production en matière de qualité et de soins prodigués dans les couvoirs et au début de l'élevage dans les poulaillers, il y aura toujours un petit pourcentage de poussins qui ne seront pas en bonne santé. Ces poussins peuvent constituer une source d'infections bactériennes et virales.

Un des outils les plus efficaces dont dispose l'éleveur est la réforme en début d'élevage des poussins chétifs, malades ou blessés. On obtient le plus grand bénéfice lorsque la réforme est effectuée immédiatement après avoir identifié ces poussins.

Dans de nombreux cas, un programme de réforme efficace peut améliorer le bien-être des animaux, la salubrité des aliments et minimiser ou remplacer la nécessité d'une antibiothérapie. La réduction de l'utilisation des antibiotiques pourrait profiter à la santé du troupeau et minimiser le risque de résistance antimicrobienne, qui est une priorité en agriculture.

Il pourrait être nécessaire d'euthanasier des poussins pour plusieurs raisons, qui ont toutes une incidence sur la santé, le bien-être et la productivité d'un troupeau. Voici un guide pour vous aider à identifier les oiseaux en mauvaise condition physique au cours des dix premiers jours de leur vie :




## Alimentation insuffisante/poussins chétifs



Chétif vs. bonne santé


Pendant deux à trois jours après l'éclosion, les poussins peuvent répondre à tous leurs besoins nutritionnels en absorbant les nutriments contenus dans leur jaune d'oeuf. Pour grandir, se développer et rivaliser avec succès, les poussins doivent consommer rapidement l'eau et les aliments offerts dans le poulailler au cours de cette même période. S'ils n'y arrivent pas, ils seront faibles et ne se rétabliront probablement pas. Ces poussins devraient donc être euthanasiés.

## Sac vitellin (jaune d'oeuf) et omphalite



À mesure que les poussins absorbent leur jaune d'œuf, l'ombilic est le dernier endroit où la peau se referme. Si le jaune d'œuf est contaminé avant de se résorber ou si des bactéries entrent par l'intermédiaire de l'ombilic avant sa fermeture, le jaune d'œuf agit comme source de nutriments pour les bactéries, ce qui entraîne une infection fulgurante appelée omphalite. Le traitement antibiotique réussit souvent à conserver les poussins en vie mais il ne guérit pas l'infection originale. Les mortalités se produisent lorsque le traitement est interrompu. L'euthanasie met fin à la souffrance et limite la quantité de bactéries dispersées dans l'environnement.

## Blessure



Les poussins peuvent se blesser pendant l'éclosion, le tri, le transport et le début de l'élevage. Les blessures peuvent provoquer des plaies et une boiterie qui sont douloureuses pour le poussin. En raison des infections qui en découlent et de l'incapacité des poussins de rivaliser pour la nourriture et l'eau, les poussins blessés devraient être euthanasiés immédiatement.

## Maladie



Les poussins malades sont plus susceptibles aux autres maladies qui auront plus tard des effets néfastes sur le troupeau. L'euthanasie précoce de ces poussins réduit la propagation possible de toute maladie et diminuera la propagation de maladie chez les oiseaux en santé.

## Poussins anormaux, avec difformités



Les poussins qui ont des difformités ou qui sont incapables d'effectuer des activités normales telles que marcher, manger et boire devraient être euthanasiés. Ces poussins ne peuvent rivaliser avec les autres, ils seront petits, faibles et ils souffriront s'ils ne sont pas réformés.

« Si vous avez des doutes sur la santé de vos oiseaux, communiquez avec votre vétérinaire ».

